

RECESIONES GINGIVALES EN PACIENTES DE ORTODONCIA

OBJETIVOS:

El objetivo es evaluar los factores desencadenantes de las recesiones gingivales en pacientes de ortodoncia. Manejo de la recesión gingival, identificación de los factores etiológicos. Manejo de la prevención de la recesión, en el tratamiento de ortodoncia

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS Y RESULTADOS

Búsqueda de estudios en literatura científica a través de PubMed, PMC, SciELO, en revistas científicas de periodoncia y de ortodoncia

Resultados pueden desencadenarse tras traumatismos, enfermedad periodontal. Las recesiones gingivales están relacionadas en ocasiones con el movimiento dentario producido por el tratamiento de ortodoncia en situaciones de mayor riesgo, vestibulizaciones o rotaciones, en periodonto de protección escasa. Entre los factores asociados se encuentran: las posiciones anormales de los dientes dentro de la arcada, el apiñamiento, el acúmulo de biofilm

CONCLUSIONES

En pacientes portadores de ortodoncia es más habitual las recesiones en la mandíbula siendo la zona más afectada los incisivos inferiores por tener una fina o inexistente tabla ósea. En los incisivos mandibulares con retracción de margen gingival es inevitable la formación de dehiscencias óseas (suele estar presente si se ha movido fuera del hueso alveolar). Durante el tratamiento de ortodoncia, se debe evitar inclinar los incisivos inferiores más de 10 ° para disminuir el riesgo de recesiones gingivales. Otros factores son por inflamación gingival o incorrecto cepillado dental, en portadores de ortodoncia es importante el uso de irrigador bucal